

tobaksavvänjning – vilka verktyg finns i lådan?




Matz Larsson



Tobaksstoppssprojektet.org

Docent, Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård, Lunds universitet
Hjärt, Lung, Fysiologi-kliniken / Tobakspreventiva Mottagningen,
Universitetssjukhuset Örebro



>12000 dör varje år p.g.a. tobaksrökning

**100 000 RÖKNINGS-ORSAKADE
VÅRDTILLFÄLLEN /ÅR**

Tobaksavvänjning

Vårdcentralens sluta-röka metod kostar **3000 kr.**




Bestående rökstopp hos 49-åring: Vinst 6 levnadsår


→500 kr per vunnet levnadsår

(samhällets krav på nya behandlingar c:a 800 000 kr/levnadsår)

ex. från Hälsoekonom Lars Hagberg, Örebro

F17.2





Symptom i nikotinabstinens-syndromet

- Nikotinbegär
- Ökad spänning
- Rastlöshet
- Irritabilitet
- Aggressivitet
- Depression
- Trötthet
- Koncentrationssvårigheter
- Ökad hunger

LÄKEMEDEL

vilka verktyg finns i lådan?

en garrett?



Nikotinläkemedel

Normalt rekommenderas en hög dos 1:a månaden.

Rökare metabolisera nikotin olika snabbt. Långsamma metabolisera brukar röka färre cigaretter.

Dosen \leftrightarrow tidigare tobakskonsumtion.

20 cig. /d. \rightarrow starkaste sorten av nikotinplåster, tuggummi o dyl.
(riktiga storrökare ev. två nikotinplåster?)

Plåster (långsamt upptag)


kombineras med snabbverkande (tuggummi, tablett eller spray)

Efter ca en månad: successiv sänkning (svagare plåster el. tuggummi, el. minskat antal).

Tugga långsamt! Blanda ej med Kaffe

Läkemedelsförmån? - **NEJ**

nikotinplåster +(tuggummi, sugtablett eller spray)



Vareniclin (Champix) 1mg
antagonist/agonist till Nikotin

Illamående? - Mat

Dämpas efter tobaksstopp

Metoclopramid?

Inga interak

Särskilt risksdata vid hjärtinfarkt

Förlängd beh? "omvänd startförpackning"

Snusavvänjning

12 v behandling kostar ca 2400 kr

Bupropion (Zyban) 150 mg

Antidepressivum/rökavvänjning

Kontraindikation: Epi!, bipolär, ätstörning

Kan ge sömnstörning

Rökning i starten

1 tablett dagligen i 7 dagar sedan 1 tablett 2 gånger
dagligen. Mot rökbegär

7v

952,50 kr

1x1 ---→13v

Voxra ett alternativ “OBS Zyban är restnoterat”

ca 400 kr




Depressionsrisk ej ökad
(EAGLES-studien, *Lancet* 2016):

Ingen ökning av
neuropsykiatiska
problem vid beh med
vareniklin eller
bupropion

Vareniclin o Bupropion kan kombineras

Nikotinabstinens...



- 1 Ökad spänning, frustration,
- 2 Rastlöshet, Aggressivitet, insomnia, irritabilitet,
- 3 frustration, ilska, ångest, Irritabilitet Aggressivitet, Depression, ökad aptit eller viktuppgång Rastlöshet
- 4 Depression, ökad aptit eller viktuppgång, Rastlöshet Trötthet, Koncentrationssvårigheter
- 5 Ökad hunger, dysfori, insomnia, irritabilitet,
- 6 frustration, ilska, ångest,
- 7 koncentrationssvårigheter, rastlöshet,
- 8 minskad hjärtfrekvens, Irritabilitet, Aggressivitet, i
- 9 insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest,
- 10 koncentrationssvårigheter, rastlöshet,
- 11 minskad hjärtfrekvens, Depression
- 12 Ökad spänning, Rastlöshet, Aggressivitet,
- 13 insomnia, irritabilitet, frustration, ilska,
- 14 ångest, Irritabilitet Aggressivitet
- 15 Depression, ökad aptit eller viktuppgång Rastlöshet
- 16 Trötthet, Koncentrationssvårigheter
- 17 Ökad hunger, dysfori, insomnia, irritabilitet,
- 18 frustration, ilska, ångest,
- 19 koncentrationssvårigheter, rastlöshet,
- 20 minskad hjärtfrekvens,
- 21 Irritabilitet, Aggressivitet, i
- 22 insomnia, irritabilitet,
- 23 frustration, ilska, ångest,
- 24 koncentrationssvårigheter, rastlöshet,

Cytisin

Partiell nikotinreceptor-agonist


Liknande effekt som vareniklin
på receptornivå
(nikotin acetylkolin receptorer)

Likvärdiga resultat som vareniklin*

Östeuropa sedan 70-talet, receptfritt i Polen

Saluförs ej i Sverige

Licens! **KLAS**, Läkemedelsverkets hemsida
(ev. kopiera/kompletera en tidigare ansökan)



Gullregn, *Laburnum anagyroides*
: Sofie Larsson

*Courtney et al. Effect of Cytisine vs Varenicline on Smoking Cessation: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2021;326(1):56-64

Cytisin

Halveringstid ca 5 tim (vareniklin ca 17 tim)

Behandling i 25 dagar (ev förlänga?)

Rökstopp senast dag 5!

Cytisin < 400 kr ***Tabex^R, Desmoxan^R, (Asmoken^R)***

E-recept (eller papper), läkemedelsförmån? JA

OBS! Patienten ska kontakta ett apotek!

Leveransen brukar ta någon månad men...

påskyndas genom överenskommelse med lokalt apotek!

Läkemedelsverkets hemsida: KLAS

Välj det inloggningssätt som passar dig bäst:

E-TJÄNSTEKORT

- > SITHS-certifikat
-

E-LEGITIMATION

- > BankID (och Nordea)
 - > Mobilt BankID
 - > Telia
-



Exempel på motivering vid licensansökan:

Metoderna för rökavvänjning är verksamma och starkt evidensbaserade. Farmakologisk behandling är en hörnsten vid tobaksavvänjning – en av sjukvårdens mest kostnadseffektiva behandlingar. Det råder brist på receptbelagda läkemedel för ändamålet. Vareniklin är restnoterat sedan länge. Patienten har hälsoproblem relaterat till tobaksbruk, har ordnat med beteendestödjande insatser och har motivation att sluta med tobaksbruk. Cytsin är godkänt av Läkemedelsverket men saluförs inte i Sverige. Det har visat ungefär likvärdiga resultat som vareniklin i kliniska prövningar.

Referenser: 1.Courtney RJ, McRobbie H, Tutka P, et al. Effect of Cytisin vs Varenicline on Smoking Cessation: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2021;326(1):56-64. 2. Walker N, Smith B, Barnes J, et al. Cytisin versus varenicline for smoking cessation in New Zealand indigenous Māori: a randomized controlled trial. Addiction 2021;116(10):2847-58.

Behandlingstid 25 dagar - rökstopp senast dag 5!

Dag	Rekommenderad dosering	Max. antal tabl./dag
1 - 3	1 Tabl. med 2 timmars mellanrum	6
4-12	1 Tabl. med 2,5 timmars mellanrum	5
13-16	1 Tabl. med 4 timmars mellanrum	4
17-20	1 Tabl. med 5 timmars mellanrum	3
21-25	1 Tabl. med 10 timmars mellanrum	2

Tabletten intas med en lämplig mängd vatten

Om du använder mer Desmoxan än du borde Symtom kan likna nikotinförgiftning (illamående, kräkningar, ökad hjärtfrekvens, variationer i blodtryck, andningsproblem, dimsyn, kramper) sluta då ta **Cytisin**.

Vid lindriga besvär kan det räcka att minska dosen och/eller sluta helt med rökning/nikotin.

Behandlingsdag	Maximal dos per dag	Tid mellan tabletterna	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.
1	6	2						
2	6	2						
3	6	2						
4	5	2,5						
5	5	2,5						
6	5	2,5						
7	5	2,5						
8	5	2,5						
9	5	2,5						
10	5	2,5						
11	5	2,5						
12	5	2,5						
13	4	4						
14	4	4						
15	4	4						
16	4	4						
17	3	5						
18	3	5						
19	3	5						
20	3	5						
21	2	10						
22	2							
23	2							
24	2							
25	2							

Läkartidningen DEBATT

Fungerande läkemedel mot tobaksberoende »för billigt«

rökning inducerar enzymet CYP1A2
Ändrad rökvana!----->

kan påverka läkemedelsmetabolismen

Warfarin

Heparin

Insulin

Teofyllin

Flekainid

Erlotinib (Tarceva)

Kombinerade P-piller

Duloxetin

Olanzapin

Klozapin

Haloperidol

Agomelatin

Melatonin

(RÖKER DU?)

Har du använt tobak/nikotin i någon form?

Hur tänker du kring
din rökning?

Har du funderat kring att
sluta?

Skulle det vara ok om vi
ägnade några minuter åt...

Så här John kan du skydda dig mot återfall

”Riskabla tillfällen”

Bocka för de som kan gälla dig:

- andra rökare
- cigaretter, askfat, tändstickor och dyl.
- alkohol
- vissa maträtter
- stress, ångest, depression
- högtidligheter och glädje
- allt som varit kopplat till rökning!

Egna förslag:

.....
.....
.....

Vad jag kan säga/tänka:

- Röksuget kommer att gå över!
- Rökning är inte längre något alternativ.
- Jag är starkare än cigaretten!

Egna förslag:

-
-
-

Mina främsta skäl att sluta röka:

-
-
-

- D**röja (räksuget går över)
- D**rick (vatten)
- D**istrahera (avleda räksuget) *
- D**jupandas (hjälper kroppen att slappna av)
- lämna besvärliga situationen
- ät en frukt, morot...
- nikotinläkemedel

egna förslag:

.....
.....

- surfa på mobilen, Suduko, korsord, sticka.....
- **1177 avslappning för hela kroppen**

Tobaksstoppssprojektet (inklusive

snus, e-cig)

Nationell forsknings-databas

FORTE, Lunds Universitet

Dansk förlaga (sedan 2001, >150 000
rökstopp)

Få ökad kunskap, kvalitet, ff a om
sårbara gruppars behandling



Rokstoppssprojektet.org

info@tobaksstoppssprojektet.org



Individens tobaksstatus 6 månader efter
behandlingen

Avlastar och skapar mer objektiv utvärdering
(gratis)

Du bidrar till att skapa en nationell databas
om tobaksavvänjning

Rokstoppssprojektet.org

info@rokstoppssprojektet.org

Tobaksstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av interventioner
för olika grupper av rökare/snusare/e-cigarette-användare i Sverige



Till dig som är tobaksavvänjare!

Nu äntligen finns möjlighet för dig som arbetar med rök- och snusavvänjning att få reda på hur det går för dina patienter!

Tobaksstoppsprojektet är ett forskningsprojekt som stödjer avvänjningsenheter för tobak i Sverige. Projektet är öppet för alla som vill ha hjälp till att utvärdera sina behandlingar.

[Mer information](#)

Champix dvs vareniklin är restnoterat sedan länge och det verkar bestå. Cytisin via licens kan bli ett mycket bra alternativ i denna situation!

[Mer information](#)

Tobaksstoppsprojektet - uppbyggnad av en nationell databas om tobaksavvänjning i Sverige

Inför operation

Rökstopp...

effekt

6-8 veckor före planerad kirurgi
risk

normaliserad

4 veckor - - -


halverad risk

Patient som blir akut opererad...

kan också vinna

– Vill du ha den bästa, näst bästa, 3:e eller...

4:e bästa behandlingen...



...sårinfektioner, försenad sårläkning,
ökad ärrbildning

Utebliven benläkning och livshotande
försämring av hjärt-lungfunktionen


Ej beredd att sluta:

Om du skulle vilja sluta röka
i framtiden finns nya metoder/läkemedel



www.tobaksfakta.org

Läkare mot Tobak



Tobaksfakta.org

Lagar för alla barns framtid



Fråga “Har du använt tobak/nikotin i någon form?”

“Om du vill sluta röka
i framtiden finns nya metoder/läkemedel”

- se till det finns tillgängligt!

Tobaksfritt ger god hälsa, ekonomi och minskad miljöförstöring

Har vi råd att inte satsa på tobaksavvänjning?